

Normas de suspensión del tratamiento anticoagulante

Anexo: AX01-POE-UCGM-010-V.1

Las normas de suspensión de tratamiento anticoagulante son las establecidas por el departamento de coagulación del servicio de hematología del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba que se recogen en el Anexo 1 y 2 en función del tipo de patología de la paciente.

Para pacientes anticoagulados, el día de la realización de la biopsia se realizará un estudio de coagulación urgente para conocer la actividad de protrombina y el INR. En pacientes con tratamiento antiagregante no hay que suspender la medicación para la realización de biopsia percutánea con anestesia local.

NORMAS DE SUSPENSIÓN DEL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE (SINTROM) PARA AQUELLOS PACIENTES NO PORTADORES DE PROTESIS MITRAL.

- Suspender la toma de sintrom 2 días antes de la biopsia.
- Reanudara la toma de sintrom, según indica el carnet la misma noche en la que se efectúe la biopsia.

NORMAS DE SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE EN PACIENTES CON PROTESIS MITRAL.

- 2 días antes de la biopsia: suspender sintrom.
- el día de la biopsia: clexane 40 mg: subcutáneo /24 horas. Por la noche tomar dosis de sintrom que indique el carnet.
- 1 día después de la biopsia: clexane 40 mg: subcutáneo/24 horas y Sintrom según indica el carné.
- 2 días después de la biopsia: suspender clexane y continuar tomando sintrom a la dosis que indique el carné.